

SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
CONTRA 
COVID-19

PROTOCOLO MEDICAMENTOSO PRECOCE DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ.

A Secretaria de Saúde de São José do Piauí, no dia 26 de maio realizou uma reunião com os médicos e equipe gestora para a construção de um protocolo de medicamentos para o tratamento da Covid-19 com sintomas leves e moderados no Município (arquivo de imagem em anexo). A medida preza pacientes que têm comorbidades, com exceção de doença cardíaca, no período de 1º até o quinto dia de infecção. O protocolo consiste em um kit de fármacos que combinam hidroxocloroquina, azitromicina, um corticoide, além de remédios para febre e dores, como paracetamol e/ou dipirona (em anexo).

Os médicos, ressaltaram que estudos recentes mostram que o uso combinado dos fármacos hidroxocloroquina + azitromicina na fase mais grave e moderada da doença não possuía comprovação de sua eficácia. Falaram que as discussões são entorno do uso precoce dessa medicação para pacientes com sintomas leves e na fase inicial da doença. Por isso, o Município de São José do Piauí vem adotando o uso desse kit, na fase inicial da doença, principalmente nos grupos de risco, desde que com criteriosa avaliação do paciente através de anamnese e aceitação do mesmo em tomar a medicação, assinando no ato da consulta o termo de Ciência e Consentimento (em anexo).

Considerando que a prescrição de toda e qualquer medicamento é prerrogativa do médico, e que o tratamento do paciente portador de COVID-19 deve ser baseado na autonomia do médico e na valorização da relação médico-paciente que deve ser a mais próxima possível, com objetivo de oferecer o melhor tratamento disponível no momento.



SÃO JOSÉ DO PIAUÍ CONTRA COVID-19


Considerando que no dia 23 de abril de 2020, o Conselho Federal de Medicina (CFM) permitiu o uso de cloroquina e a hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, com a ressalva de que o médico tenha o consentimento do paciente e de que não há evidências sólidas de que essas drogas tenham efeito confirmado na prevenção e combate ao vírus.

Ficou definido duas classificações (leves e moderados) para a intervenção dos medicamentos no Município de São José do Piauí, visto que os casos mais graves são encaminhados ao hospital de referência:

Classificação dos sinais e sintomas

| SINAIS E SINTOMAS LEVES | SINAIS E SINTOMAS MODERADOS | SINAIS DE GRAVIDADE |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">❖ Anosmia❖ Ageusia❖ Coriza❖ Diarreia❖ Dor abdominal❖ Febre❖ Mialgia❖ Tosse❖ Fadiga❖ Cefaleia | <ul style="list-style-type: none">❖ Tosse persistente + febre persistente diária ou❖ Tosse persistente + piora progressiva de outro sintoma relacionado a COVID-19 (adinamia, prostração, hiporexia, diarreia) ou❖ Pelo menos um dos sintomas acima + presença de fator de risco | <ul style="list-style-type: none">❖ Síndrome Respiratória Aguda Grave – Síndrome Gripal que apresente:❖ Dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no Tórax OU saturação de O₂ menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada de lábios ou rosto |


O Município de São José do Piauí com o objetivo de ampliar o acesso dos pacientes hipossuficientes o tratamento medicamentoso no âmbito do SUS, está seguindo as orientações para tratamento medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico de COVID-1 de acordo com a classificação dos sinais e sintomas que foi feita pelo Ministerio da Saúde:



SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
CONTRA 
COVID-19

Orientação de tratamento conforme a Classificação dos Sinais e Sintomas

| Orientação para prescrição em PACIENTES ADULTOS | FASE 1 1º AO 5º DIA | FASE 2 6º AO 14º DIA | FASE 3 APÓS 14º DIA |
|---|--|-------------------------|---|
| SINAIS E SINTOMAS LEVES | <i>Cloroquina</i> =D1: 450mg 12/12h =D2 ao D5: 450mg 24/24h + <i>Azitromicina</i> =500mg 1x ao dia, durante 5 dias Ou <i>Sulfato de Hidroxicloroquina</i> =D1: 400mg 12/12h =D2 ao D5: 400mg 24/24h + <i>Azitromicina</i> =500mg 1x ao dia, durante 5 dias | | <i>Prescrever medicamento sintomático</i> |



SÃO JOSÉ DO PIAUÍ CONTRA COVID-19

| Orientação para prescrição em PACIENTES ADULTOS | FASE 1 1º AO 5º DIA | FASE 2 6º AO 14º DIA | FASE 3 APÓS 14º DIA |
|---|---|-------------------------|------------------------|
| SINAIS E SINTOMAS MODERADOS | Considerar a Internação Hospitalar <ul style="list-style-type: none">- Afastar outras causas de gravidade- Avaliar presença de infecção bacteriana- Considerar imunoglobina humana- Considerar anticoagulação- Considerar corticoterapia | | |
| | Cloroquina =D1: 450mg 12/12h =D2 ao D5: 450mg 24/24h + Azitromicina =500mg 1x ao dia, durante 5 dias Ou Sulfato de Hidroxicloroquina =D1: 400mg 12/12h =D2 ao D5: 400mg 24/24h + Azitromicina =500mg 1x ao dia, durante 5 dias | | |

De acordo com o protocolo Municipal, pessoas com sintomas respiratórios devem comunicar a situação assim que chegarem aos postos de saúde de São José do Piauí. Terá um tratamento específico, com prioridade para idosos acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, crianças, gestante e mulheres em período puerperal.

O protocolo abrange um sistema de triagem mais rápido (fast track), fluxo de atendimento da demanda espontânea, a fim de beneficiar a identificação dos casos suspeitos de Covid-19, seguindo a lógica da classificação de risco. Ao chegar na área externa da unidade, o paciente vai ser abordado por profissionais que farão uma triagem na área externa, o paciente que está com suspeita da doença deve responder um questionamento básico sobre seus sintomas e históricos de viagens. O responsável pela triagem, imediatamente, higienizará as mãos do paciente e entregará uma máscara e o mesmo será encaminhado a sala de sintomas gripais, onde o técnico de enfermagem, fará classificação de risco e, caso



SÃO JOSÉ DO PIAUÍ CONTRA COVID-19

necessário, o paciente será conduzido a um quarto de isolamento, sem fila de espera. As unidades já possuem um local específico para isolamento do paciente com suspeita ou infectado pelo Coronavírus. O quarto de isolamento, fica separados dos demais, seguindo normas padrões do Ministério da Saúde, janelas abertas, portas fechadas, ar-condicionado desligado e todos os profissionais que tiverem acesso ao local farão uso de equipamentos de segurança. Os casos mais graves devem ser encaminhados ao Hospital de Referência Justino Luz em Picos.

Os casos com sintomas leves, moderado de gripe, sem dificuldades respiratórias ou doenças preexistentes, serão atendidos no próprio posto de saúde. No caso de transmissão comunitária, a síndrome gripal será tratada como infecção pelo novo coronavírus e o paciente será encaminhado ao isolamento domiciliar do paciente e dos familiares por 14 dias, com monitoramento pelos profissionais de saúde a cada 24 horas. Caso familiares também apresentem sintomas, o que pode ser indicação de infecção, devem utilizar máscaras, inclusive quando forem procurar atendimento na unidade de saúde.

Já os casos mais graves serão encaminhados para o Hospital o Serviço de Referência em Picos, tendo como base o fluxograma do território vale do rio guaribas (em anexo). Isso envolve pessoas com dificuldade de respirar e com doenças cardíacas, respiratórias crônicas, renais ou cromossômicas. Pessoas com sintomas sem complicações não devem sobrecarregar o sistema de saúde, elas devem ser atendidas no posto de saúde e seguir a conduta medica de tratamento no Município.

Na reunião para elaboração de protocolo ficou decidido, que, diante da impossibilidade de testar todas as pessoas, os exames serão realizados em pacientes sintomáticos entre o sétimo e decimo dia de início de sintomas. Os assintomáticos só farão testado no caso quando for contatos intradomiciliar com caso positivo.

Para a construção desse protocolo o município teve como referência



SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
CONTRA 
COVID-19

as orientações do ministério da saúde para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da covid-19 e o Proposta de tratamento precoce para covid-19-2ª revisão de 29 de maio de 2020 do CRM-MA.



SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
CONTRA 
COVID-19


ANEXO



SÃO JOSÉ DO PIAUÍ CONTRA COVID-19


REUNIÃO COM MÉDICOS, ENFERMEIROS, GESTÃO E
INTEGRANTES DO COMITÊ DE ETICA NO COMBATE E ENFRENTAMENTO
AO COVID-19






SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
CONTRA 
COVID-19

KIT FARMACOLÓGICO



SÃO JOSÉ DO PIAUÍ CONTRA COVID-19





SÃO JOSÉ DO PIAUÍ CONTRA COVID-19

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO

Termo de Ciência e Consentimento

Hidroxicloroquina/Cloroquina em associação com Azitromicina para COVID 19

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Fui devidamente informado(a), em linguagem clara e objetiva pelo(a) médico(a), de que as avaliações médicas ou laboratoriais revelaram possibilidade ou comprovação de diagnóstico:

COVID 19 causada pelo coronavírus SARS-COV-2

E com base neste diagnóstico me foi orientado o seguinte tratamento/procedimento:

Cloroquina ou Hidroxicloroquina em associação com Azitromicina


OS PROCEDIMENTOS, SEUS BENEFÍCIOS, RISCOS E ALTERNATIVAS

Fui devidamente informado(a), em linguagem clara e objetiva pelo(a) médico(a), que:

1. A cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos disponíveis há muitos anos para a prevenção e tratamento da malária e também para o tratamento de algumas doenças reumáticas como artrite reumatoide e lúpus. Investigadores chineses demonstraram a capacidade dessas drogas de inibir a replicação do coronavírus em laboratório (*in vitro*). Um estudo francês mostrou que a eliminação do coronavírus da garganta de portadores da COVID-19 se deu de forma mais rápida com a utilização da combinação de hidroxicloroquina e o antibiótico azitromicina, quando comparados a pacientes que não usaram as drogas. Entretanto, não há, até o momento, estudos suficientes para garantir certeza de melhora clínica dos pacientes com COVID-19 quando tratados com cloroquina ou hidroxicloroquina;
2. A Cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais como redução dos glóbulos brancos, disfunção do fígado, disfunção cardíaca e arritmias, e alterações visuais por danos na retina.

Compreendi, portanto, que não existe garantia de resultados positivos para a COVID-19 e que o medicamento proposto pode inclusive apresentar efeitos colaterais;

Estou ciente de que o tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina associada à azitromicina pode causar os efeitos colaterais descritos acima e outros menos graves ou menos frequentes, os quais podem levar à disfunção de órgãos, ao prolongamento da internação, à incapacidade temporária ou permanente e até ao óbito.



SÃO JOSÉ DO PIAUÍ CONTRA COVID-19

Também fui informado(a) que, independente do uso da cloroquina ou hidroxicloroquina associada à azitromicina, será mantido o tratamento padrão e comprovadamente benéfico para minha situação, que pode incluir medidas de suporte da respiração e oxigenação, ventilação mecânica, drogas para sustentar a pressão e fortalecer o coração, hemodiálise e antibióticos, entre outras terapias oferecidas a pacientes que estão criticamente doentes.

AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Por livre iniciativa, aceito correr os riscos supramencionados e dou permissão/autorização voluntária para que os medicamentos sejam utilizados da forma como foi exposto no presente termo;

Esta autorização é dada ao(à) médico(a) abaixo identificado(a), bem como ao(s) seu(s) assistente(s) e/ou outro(s) profissional(is) por ele selecionado(s);

Tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas relativas ao(s) procedimento(s), após ter lido e compreendido todas as informações deste documento, antes de sua assinatura;

Apesar de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas e estando plenamente satisfeito(a) com as informações recebidas, reservo-me o direito de revogar este consentimento antes que o(s) procedimento(s), objeto deste documento, se realize(m).

| |
|--|
| _____, ____ de _____ : ____ (hh:min) |
| <input type="checkbox"/> Paciente <input type="checkbox"/> Responsável |
| Nome: _____ |
| Assinatura: _____ |

DECLARAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL

CONFIRMO que expliquei detalhadamente para o(a) paciente e/ou seu(s) familiar(es), ou responsável(eis), o propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento(s) /procedimento(s) acima descritos, respondendo às perguntas formuladas pelos mesmos, e esclarecendo que o consentimento que agora é concedido e firmado poderá ser revogado a qualquer momento antes do procedimento. De acordo com o meu entendimento, o paciente ou seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado.


| |
|--|
| _____, ____ de _____ de 20____ : ____ (hh:min) |
| Nome do Médico: _____ CRM: _____ |
| Assinatura: _____ |



SÃO JOSÉ DO PIAUÍ CONTRA COVID-19

FLUXOGRAMA DO TERRITÓRIO VALE DO RIO GUARIBAS

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID – 19¹ TD VALE DO GUARIBAS



¹ Esse fluxograma é dinâmico, podendo ser reavaliado de acordo com a situação epidemiológica.

² Recomenda-se que todas as UBS possuam oxímetros para verificação de saturação de O₂ e que na consulta seja avaliado a presença de dispneia.

* O CIEM recebe pacientes a partir de 12 anos.

Municípios pactuados com Hospital Regional de Paulistana: Quelmada Nova, Betânia, Acauã, Jacobina, Patos, Caridade, Curral Novo, São Francisco de Assis, Lagoa do Barro.

Municípios pactuados com Hospital de Jalcós: Massapé, Belém, Campo Grande, Padre Marcos, Patos, Caridade.



SÃO JOSÉ DO PIAUÍ CONTRA COVID-19

ESTRATIFICAÇÃO DA GRAVIDADE E MANEJO CLÍNICO

CASOS LEVES: aqueles que podem ser acompanhados completamente no âmbito da APS/ESF devido à menor gravidade do caso;

CASOS GRAVES: aqueles que se encontram em situação de maior gravidade e, portanto, necessitam de estabilização na APS/ESF e encaminhamento a centro de referência/urgência/hospitais para avaliação ou intervenções que exijam maior densidade tecnológica.

| | |
|--|---|
| MANEJO NA APS/ESF | <p style="text-align: center;">SÍNDROME GRIPAL CONFIRMADA:</p> <p style="text-align: center;">Febre \geq 37,8°C (afetada ou referida) e pelo menos um desses sintomas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tosse• Dor de garganta• Dificuldade respiratória <p style="text-align: center;">e</p> <p style="text-align: center;">Ausência de condições clínicas de risco que indicam avaliação em centro de referência</p> <p style="text-align: center;">MEDIDAS FARMACOLÓGICAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Prescrição de fármacos para o controle de sintomas, caso não haja nenhuma contraindicação.• Prescrever Oseltamivir se Síndrome Gripal e pessoa com condições de risco <p style="text-align: center;">MEDIDAS CLÍNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">• O acompanhamento do paciente deve ser feito, preferencialmente por telefone, a cada 24hs em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de risco e a cada 48hs nos demais, até completar 14 dias do início dos sintomas.• Caso seja necessário, realizar atendimento presencial, idealmente no domicílio.• Manter alimentação balanceada e uma boa oferta de líquidos <p style="text-align: center;">CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR</p> <ul style="list-style-type: none">• Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de algum novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes.• Manter paciente em quarto isolado e bem ventilado até o fim do período sintomático. Destacam-se os seguintes fatores do cuidado do paciente em isolamento: a higiene respiratória e os hábitos saudáveis de alimentação. Todos os contatos domiciliares do paciente também deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias. Caso apresentar os sintomas, deverão entrar em contato com a equipe de saúde para receber atendimento. |
| ENCAMINHAMENTO PARA CENTRO DE REFERÊNCIA/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA | <p style="text-align: center;">SÍNDROME GRIPAL COM OU OS SEGUINTE SINAIS OU SINTOMAS DE GRAVIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Saturação de SpO2 $<$95% em ar ambiente• Sinais de desconforto respiratório ou aumento de frequência respiratória avaliada de acordo com a idade• Plora nas condições clínicas de doenças de base• Hipotensão <p style="text-align: center;">OU</p> <p style="text-align: center;">Condições clínicas de risco:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diabetes (conforme juízo clínico)• Doenças cardíacas crônicas descompensadas• Doenças respiratórias crônicas descompensadas• Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)• Imunossuprimidos • Portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica• Gestante de alto risco• Doença hepática em estágio avançado• Obesidade (IMC \geq40)• Em crianças: além dos anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. |



NOTIFICAÇÃO IMEDIATA via formulário pelo e_SUS VE <https://notifica.saude.gov.br/>